

PROTECT

30 tableta

Dodatak ishrani,
sa zaslađivačima

DevitIND₃ 2000 IU

Optimalna doza sunca

DevitIN D₃ 2000 IU tablete namenjene su normalnoj funkciji imunog sistema i održavanju normalne funkcije mišića, kostiju i zuba.

Vitamin D se često naziva „vitaminom sunca“ jer ga ljudski organizam pod dejstvom sunčeve svetlosti sam sintetizuje u koži. Međutim, postoje situacije kada sinteza u koži nije dovoljna da zadovolji potrebe organizma za vitaminom D₃.

Nedostatak vitamina D se javlja kod osoba koje se ne izlažu sunčevoj svetlosti u dovoljnoj meri, kod osoba sa malapsorpcijom masti, hroničnim oboljenjima jetre, cističnom fibrozom, inflamatornim bolestima creva, kod gojaznih osoba, kao i kod žena u postmenopauzi. Takođe, starije osobe su često sklone nedostatku vitamina D zbog nedovoljnog izlaganja suncu, ali i zbog korišćenja određenih lekova koji mogu da utiču na apsorpciju ili metabolizam vitamina D.

Glavna funkcija vitamina D je regulacija homeostaze kalcijuma u telu i modulacija skeleta, odnosno, razvoj i mineralizacija kostiju. Zahvaljujući njegovoj ulozi u apsorpciji kalcijuma i fosfora iz digestivnog trakta, vitamin D omogućava adekvatnu izgradnju i održavanje zdravlja kostiju i zuba i važan je faktor u prevenciji nastanka osteoporoze.

Pored toga, vitamin D ostvaruje i druge važne funkcije u telu. Veoma je značajan za postizanje snažnog imuniteta i pravilnu funkciju mišića. Vitamin D doprinosi smanjenju rizika od padova povezanih sa mišićnom slabošću i posturalnom nestabilnošću. Osteoporoza i slabost mišića predstavljaju faktore rizika za prelome kostiju kod muškaraca i žena preko 60 godina.

Identifikacija receptora za vitamin D u različitim ćelijama i tkivima podstakla je istraživanje kliničkih efekata i potencijal primene vitamina D u imunomodulaciji, prevenciji nastanka malignih oboljenja, autoimunim bolestima, bolestima kardiovaskularnog sistema, kao i drugim patološkim stanjima.

Vitamin D može uticati i na popravljavanje raspoloženja, jer je prisustvo receptora za vitamin D identifikovano u delovima mozga koji su odgovorni za emocije i raspoloženje. Nedostatak vitamina D može biti povezan sa povećanim nivoom stresa, anksioznošću i depresijom.

DevitIN D₃ 2000 IU tablete se preporučuju:

- ✓ **Za pravilnu funkciju imunog sistema i jačanje odbrambenih sposobnosti organizma**
- ✓ **Za prevenciju i tretman osteopenije, osteomalacije i osteoporoze**
- ✓ **Za održavanje normalne funkcije mišića i povećanje mišićne snage**
- ✓ **Za pravilnu apsorpciju kalcijuma i fosfora i održavanje fiziološkog nivoa kalcijuma u krvi**
- ✓ **Za smanjenje zapaljenskih procesa u telu**
- ✓ **Kod osoba sa malapsorpcijom masti, autoimunim oboljenjima, dijabetesom, kardiovaskularnim i neurodegenerativnim bolestima**
- ✓ **Kod osoba sa psorijazom**

Aktivan sastojak:	100 g proizvoda sadrži:	1 tableta sadrži:
Vitamin D ₃ (holekalciferol)	25 000 µg	50 µg (1000%*)

*-% nutritivne referentne vrednosti

Sastojci: sredstvo za povećanje zapremine: ksilitol; kukuruzni skrob; sredstvo za povećanje zapremine: mikrokristalna celuloza; holekalciferol; ERYLITE® Stevia 400 (nosač: eritritol, zaslađivač: steviol glikozidi); stabilizator: kopolimer polivinilpirolidon-vinil acetat; aroma kajsije (sadrži **laktazu**); sredstvo protiv zgrudnjavanja: magnezijum-stearat; regulator kiselosti: limunska kiselina; sredstvo protiv zgrudnjavanja: silicijum-dioksid; aroma limuna; zaslađivač: acesulfam-K.

Nutritivne informacije:	100 g proizvoda prosečno sadrži:	1 tableta prosečno sadrži:
Energetska vrednost (kJ/kcal)	926.6/220.6	1.8/0.4
Masti (g)	1.84	<0.01
- od kojih zasićene masne kiseline (g)	0.88	<0.01
Ugljeni hidrati (g)	58.74	0.11
- od kojih šećeri (g)	0.78	<0.01
Proteini (g)	0.96	<0.01
So (g)	0.16	<0.01

Način upotrebe: Odrasli: Jedna tableta dnevno. Tableta se može popiti uz čašu vode ili sažvakati. Preporučuje se uzimanje tablete uz glavni obrok kako bi se dodatno poboljšala apsorpcija vitamina D.

Napomene: Dodaci ishrani nisu zamena za raznovrsnu, uravnoteženu ishranu i zdrav način života. Čuvati van domašaja male dece.

Upozorenja: Preporučena dnevna doza se ne sme prekoračiti. Vitamin D je kontraindikovano kod osoba sa hiperkalcemijom. Mere opreza su potrebne kod osoba koje koriste tiazid, digoksin ili bilo koje druge kardiotonične glikozide. Proizvod ne treba da uzimaju osobe preosetljive na neki od sastojaka proizvoda. Ukoliko se u toku primene ovog proizvoda jave reakcije preosetljivosti, dalju primenu treba prekinuti i javiti se lekaru. Trudnice i dojilje proizvod mogu da koriste samo u dogovoru sa svojim lekarom. Ne uzimati istovremeno sa drugim dijetetskim suplementima sa vitaminom D. Nakon mesec dana korišćenja potrebno je prekontrolisati nivo vitamina D u krvi. Prekomerna upotreba može da izazove laksativni efekat.

Način čuvanja: Čuvati na suvom i tamnom mestu, na temperaturi do 25°C.

Rok upotrebe: 3 godine

Pakovanje: Složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 30 tableta i uputstvo za upotrebu.

Proizvođač: ESENSA d.o.o., Viline vode bb, Beograd, Republika Srbija

Zemlja porekla: Republika Srbija

Informacije možete dobiti besplatnim pozivom iz Srbije na broj: 0800 200 300 ili putem e-mail-a: informacije@esensa.rs



JP2



www.esensa.rs



DevitIND₃ dostupan je i u ostalim oblicima:



ORALNE KAPI
DevitIND₃
2000 IU
vitamina D



ORALNE KAPI
DevitIND₃
400 IU
vitamina D



ORALNI SPREJ
DevitIND₃
1000 IU
vitamina D
+ lipozomalni cink

