

PROTECT

30 tableta za žvakanje

DevitIN D₃ 2000 IU

Optimalna doza sunca

DevitIN D₃ 2000 IU je dijetetski proizvod u obliku tableta za žvakanje, koji u jednoj tableti (preporučena dnevna doza) sadrži 50 µg (2000 IU) vitamina D₃.

DevitIN D₃ 2000 IU tablete za žvakanje su namenjene za primenu kod osoba sa oslabljenim imunim sistemom, kod demineralizacije kostiju koja vodi razvoju osteomalacije, osteopenije i osteoporoze, kao i u svim drugim stanjima u kojima je neophodna nadoknada vitamina D. Pored povoljnog uticaja koji ostvaruje u navedenim stanjima, vitamin D3 doprinosi smanjenju upalnih procesa i održavanju pravilne funkcije mišića.

Vitamin D se često naziva „vitaminom sunca“ jer ga ljudski organizam pod dejstvom sunčeve svetlosti sam sintetiše u koži. Međutim, postoje situacije kada sinteza u koži nije dovoljna da zadovolji potrebe organizma za vitaminom D₃.

Nedostatak vitamina D se javlja kod osoba koje se ne izlažu sunčevoj svetlosti u dovoljnoj meri, kod osoba sa malapsorpcijom masti, hroničnim oboljenjima jetre, cističnom fibrozom, inflamatornim bolestima creva, kod gojaznih osoba, kao i kod žena u postmenopauzi. Takođe, starije osobe su često sklene nedostatku vitamina D zbog nedovoljnog izlaganja suncu, ali i zbog korišćenja određenih lekova koji mogu da utiču na apsorpciju ili metabolizam vitamina D.

Glavna funkcija vitamina D je regulacija homeostaze kalcijuma u telu i modulacija skeleta, odnosno, razvoj i mineralizacija kostiju. Zahvaljujući njegovoj ulozi u apsorpciji kalcijuma i fosfora iz digestivnog trakta, vitamin D omogućava adekvatnu izgradnju i održavanje zdravlja kostiju i zuba i važan je faktor u prevenciji nastanka osteoporoze.

Pored toga, vitamin D ostvaruje i druge važne funkcije u telu. Veoma je značajan za postizanje snažnog imuniteta i pravilnu funkciju mišića. Vitamin D doprinosi smanjenju rizika od padova povezanih sa mišićnom slabobošću i posturalnom nestabilnošću. Osteoporiza i slabost mišića predstavljaju faktore rizika za prelome kostiju kod muškaraca i žena preko 60 godina.

Identifikacija receptora za vitamin D u različitim celijama i tkivima podstakla je istraživanje kliničkih efekata i potencijal primene vitamina D u imunomodulaciji, prevenciji nastanka malignih oboljenja, autoimunim bolestima, bolestima kardiovaskularnog sistema, kao i drugim patološkim stanjima.

Vitamin D može uticati i na popravljanje raspoloženja, jer je prisustvo receptora za vitamin D identifikованo u delovima mozga koji su odgovorni za emocije i raspoloženje. Nedostatak vitamina D može biti povezan sa povećanim nivoom stresa, anksioznošću i depresijom.

DevitIN D₃ 2000 IU tablete za žvakanje se preporučuju:

- ✓ Za pravilnu funkciju imunog sistema i jačanje odbrambenih sposobnosti organizma
- ✓ Za prevenciju i tretman osteopenije, osteomalacije i osteoporoze
- ✓ Za održavanje pravilne funkcije mišića i povećanje mišićne snage
- ✓ Za pravilnu apsorpciju kalcijuma i fosfora i održavanje fiziološkog nivoa kalcijuma u krvi
- ✓ Za smanjenje zapaljenskih procesa u telu
- ✓ Kod osoba sa malapsorpcijom masti, autoimunim oboljenjima, dijabetesom, kardiovaskularnim i neurodegenerativnim bolestima
- ✓ Kod osoba sa psorijazom

DevitIND₃ 2000 IU tablete za žvakanje omogućavaju jednostavnu suplementaciju vitaminom D i poseduju prijatan ukus brusnice.

Aktivan sastojak:	100 g proizvoda sadrži:	1 tableta (0.2 g) sadrži:	%NRV*
Vitamin D ₃ (holekalciferol)	25000 µg	50 µg	1000

*NRV – nutritivna referentna vrednost

Sastojci: sredstvo za povećanje zapremine: mikrokristalna celuloza; dekstroza anhidrovana; kukuruzni skrob; holekalciferol; sredstvo protiv zgrudjavanja: magnezijum-stearat; stabilizator: hidroksipropilceluloza; aroma; regulator kiselosti: limunska kiselina; sredstvo protiv zgrudjavanja: silicijum-dioksid; zasladičač: acesulfam-K.

Nutritivne informacije:	100 g proizvoda prosečno sadrži:	1 tableta (0.2 g) prosečno sadrži:
Energetska vrednost (kJ/kcal)	1157.0/275.4	2.3/0.5
Masti (g)	2.73	<0.01
- od kojih zasićene masne kiseline (g)	0.07	<0.01
Ugljeni hidrati (g)	46.84	0.10
- od kojih šećeri (g)	32.46	0.06
Proteini (g)	<0.10	<0.01
So (g)	<0.10	<0.01

Način upotrebe: Odrasli: Sažvakati jednu tabletu dnevno.

Važne napomene: Proizvod se mora koristiti pod medicinskim nadzorom. Proizvod predstavlja nutritivno nepotpunu namirnicu i nije pogodan kao jedini izvor hrane za osobe kojima je namenjen. Proizvod nije namenjen za parenteralnu upotrebu. Čuvati van domaćaja dece.

Upozorenja: Vitamin D je kontraindikovan kod osoba sa hiperkalcemijom. Mere opreza su potrebne kod osoba koje koriste tiazid, digoksin ili bilo koje druge kardiotonične glikozide. Preporučena dnevna doza se ne sme prekoracići. Proizvod ne treba da uzimaju osobe preosetljive na neki od sastojaka proizvoda. Ukoliko se u toku primene ovog proizvoda javi reakcije preosetljivosti, dalju primenu treba prekinuti i javiti se lekaru. Trudnice i dojilje proizvod mogu da koriste samo u dogovoru sa svojim lekarom.

Način čuvanja: Čuvati na suvom i tamnom mestu, na temperaturi do 25°C.

Rok upotrebe: 3 godine

Pakovanje: Složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 3 blistera sa po 10 tableta za žvakanje i uputstvo za upotrebu

Proizvođač: Esensa d.o.o., Viline vode bb, Beograd, Republika Srbija

Zemlja porekla: Republika Srbija

Informacije možete dobiti besplatnim pozivom iz Srbije na broj:
0800 200 300 ili putem e-mail-a: informacije@esensa.rs

JP2



www.esensa.rs



DevitIND₃ dostupan je i u ostalim oblicima:

