

100x150mm



PANTONE 2945 C

NOVEO

Gasimetin® 0+

Simetikon kapi
40 mg/ml

30 ml
oralne kapi



Sastav:

voda, simetikon (40 mg/ml), natrijum benzoat, kalijum sorbat, natrijum saharin, karboksimetil celuloza, limunska kiselina, silicijum i aroma.

Terapijske indikacije:

Gasimetin Simetikon kapi su medicinsko sredstvo indikovano u lečenju i prevenciji dispeptičnih tegoba, meteorizma, aerofagije i grčeva usled gasova kod beba, dece i odraslih.

Doziranje i način primene:

Sadržaj simetikona u rastvoru je 40 mg/ml.

Jedna doza: 20 kapi Gasimetin Simetikon kapi (=1 ml).

Jedna doza: 20 kapi sadrži 40 mg simetikona.

Odrasli (12 i više godina): 20–40 kapi, po potrebi razblaženih u tečnosti, najbolje nakon obroka, 2–4 puta dnevno ili prema savetu lekara.

Deca (2–12 godina): 20 kapi, po potrebi razblaženih u tečnosti, najbolje nakon obroka, 1–3 puta dnevno ili prema savetu lekara.

Bebe (0–2 godine): 20 kapi, po potrebi razblaženih u tečnosti, najbolje nakon obroka, 1–2 puta dnevno ili prema savetu lekara.

Uputstvo za upotrebu:

Pre upotrebe proizvod dobro promućkati. Nakon upotrebe bočicu dobro zatvoriti.

Čuvanje:

Čuvati na sobnoj temperaturi. Proizvod čuvati dobro zatvoren i držati dalje od izvora toplote. Nakon otvaranja, ne koristiti proizvod duže od 30 dana.

Kontraindikacije:

Ne koristiti proizvod u slučaju preosetljivosti na sastojke proizvoda.

Upozorenja:

Za ovo medicinsko sredstvo nema posebnih mera predostrožnosti pri upotrebi; međutim, skrećemo pažnju na sledeće:

- Ne koristiti proizvod duže od 30 dana
- U proizvodu se mogu pojaviti dve odvojene faze. Nakon mućkanja sadržaja bočice, dobija se izgled homogene emulzije.
- Čuvati van domašaja dece.
- Ne prekoračivati preporučenu dozu.
- Ne koristiti nakon isteka roka upotrebe. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na neoštećen i pravilno skladišten proizvod.
- Ne koristiti ukoliko je pakovanje oštećeno.
- Nijedna komponenta proizvoda, uključujući i kapaljku, ne sme biti oštećena.
- Ukoliko nakon kratkog perioda lečenja (7 dana) ne dođe do značajnog poboljšanja, konsultujte se sa lekarom.

- U slučaju pojave neželjenih reakcija prekinite upotrebu proizvoda i konsultujte se sa lekarom koji će propisati odgovarajuću terapiju.
- Ukoliko tokom upotrebe primetite da je kapaljka zaprljana, dobro je očistite pre nego što je stavite u bočicu kako biste sprečili mogućnost kontaminacije proizvoda.
- Ne koristiti u slučaju sumnje na perforaciju creva ili ileusa.
- U slučaju ozbiljnog neželjenog događaja povezanog sa ovim medicinskim sredstvom dogadaj prijaviti proizvođaču i nadležnoj instituciji.

Pridržavanjem priloženog uputstva za upotrebu smanjuje se rizik od neželjenih dejstava. Važno je da obavestite lekara ili farmaceuta o svim neželjenim dejstvima koja nisu navedena u priloženom uputstvu za upotrebu.

Interakcije i inkompatibilije:

U slučaju primene lekova koji sadrže levotiroksin ili karbamazepin, proizvod Gasimetin simetikon kapi se može koristiti isključivo nakon savetovanja sa lekarom.

Ne preporučuje se istovremena upotreba simetikona sa:

- laksativima na bazi mineralnog ulja (parafin), jer se kombinacijom ova dva proizvoda smanjuje njihovo dejstvo.
- proizvodima: cefradin, gliklazid, cimetidin, ranitidin, kvinidin, cefuroksim, fenitoin jer njihova interakcija može ograničiti apsorpciju ovih proizvoda.

Trudnoća i dojenje:

Trudnoća: Ne postoje adekvatni podaci o upotrebi ovog proizvoda kod trudnica, tako da ga ne treba koristiti izuzev ukoliko zaista postoji potreba i tek nakon procene lekara.

Dojenje: Nije poznato da li se simetikon izlučuje majčinih mlekom; stoga, ne treba koristiti proizvod izuzev ukoliko zaista postoji potreba i tek nakon procene lekara.

Upravljanje vozilima:

Nije prijavljeno delovanje na sposobnost upravljanja vozilom i rukovanje mašinama.

Neželjena dejstva i uzimanje veće doze: Kao i svi proizvodi koji sadrže simetikon, i ovo medicinsko sredstvo može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj proizvod.

Obratite se lekaru ukoliko tokom upotrebe proizvoda Gasimetin Simetikon kapi primetite sledeća neželjena dejstva:

- povraćanje, dijareju, abdominalni bol, bol u ileumu, mučninu
- ošip
- oticanje lica, očiju i usana, oticanje grla uz teškoće pri disanju (angioedem)

Ova neželjena dejstva se retko javljaju.

Nisu prijavljena neželjena dejstva u slučaju uzimanja veće doze proizvoda.

Pakovanje: Gasimetin Simetikon kapi su medicinsko sredstvo koje se nalazi u bočici od 30 ml sa kapaljkom i sadrži vodeni rastvor simetikona.

 **Proizvođač:** Gruppo Farmaimpresa srl
Via Cipro 1 Brescia (Italy)
www.farmaimpresa.it
info@farmaimpresa.it



MD REF
FT,MDR,16.12.30.F03
rev. 18-05-2023



Ovlašćeni predstavnik proizvođača i distributer: ESENSA d.o.o.,
Vilinske vode bb, Beograd, Republika Srbija, www.esensa.rs

Broj rešenja o registraciji medicinskog sredstva: 515-02-03150-23-003 od 21.08.2023.



Medicinsko sredstvo se ne sme bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Obratite se farmaceutu za odlaganje medicinskog sredstva koje vam više nije potrebno. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.