

Uputstvo za upotrebu – pažljivo pročitati!

Namena:

Za smanjenje napetosti u gastrointestinalnom traktu
Prašak za peroralnu primenu

Sastav:

1 kesica praška za peroralnu primenu (jedna doza) sadrži 125 mg simetikona.
Pomoćne supstance: sorbitol (iz kukuruza ili pšenice), silicijum dioksid, maltodekstrin, polivinilpirolidon, limunska kiselina, aroma limuna, sukraloza.

Sadržaj pakovanja

Pakovanje sadrži 20 kesica praška za peroralnu primenu.

Mehanizam delovanja i indikacije

Ovaj prašak za peroralnu primenu je proizvod koji sadrži simetikon, supstancu koja mehanički razgrađuje mehuriće vazduha koji se nalaze u gastrointestinalnom traktu.

Mehurići se grupišu stvarajući slobodni gas koji se lakše eliminiše.

Prašak za peroralnu primenu se koristi za smanjivanje simptoma gastrointestinalnih poremećaja, koji se mogu pripisati prisustvu gasova, kao što su, na primer: meteorizam, osećaj napetosti/nadutosti, podrigivanje.

Napomena: U slučaju da se pojave nove gastrointestinalne smetnje ili da se nastavljaju postojeće smetnje, obratiti se svom lekaru kako bi se utvrdio njihov uzrok.

Kontraindikacije

Kada ne treba koristiti prašak za peroralnu primenu?

Prašak za peroralnu primenu ne treba koristiti u slučaju poznate hiperosetljivosti na simetikon ili na neki drugi sastojak proizvoda.

Prašak za peroralnu primenu ne treba koristiti u slučaju da postoje bolesti gastrointestinalnog trakta; u tom slučaju, pre upotrebe proizvoda obratiti se svom lekaru.

Prašak za peroralnu primenu za smanjenje napetosti u gastrointestinalnom traktu ne treba davati deci mlađoj od 12 godina.

Trudnoća i dojenje

Ne postoje podaci o upotrebi praška za peroralnu primenu u trudnoći ili tokom dojenja.

Iako proizvod prolazi kroz gastrointestinalni trakt nepromenjen i eliminiše se, a da ga organizam ne apsorbuje, treba ga koristiti samo prema uputstvu svog lekara.

Mere predostrožnosti za upotrebu i upozorenja

U slučaju da se pojave nove gastrointestinalne smetnje ili da se nastavljaju postojeće smetnje, obratiti se svom lekaru kako bi se utvrdio uzrok takvih smetnji i dijagnostikovalo potencijalno prisustvo osnovne bolesti koja zahteva posebnu terapiju.

Proizvod se obično dobro podnosi. Važno je obavestiti lekara ili farmaceuta o pojavi neželjenih dejstava ili interakcija sa lekovima koje nisu opisane u ovom uputstvu.

Interakcije sa lekovima

Koji lekovi mogu da izmene dejstvo praška za peroralnu primenu?

Interakcije sa lekovima kod ljudi nisu apsolutno potvrđene. Obratiti se svom lekaru ili farmaceutu pre upotrebe proizvoda zajedno sa nekim lekom.

Doziranje i način upotrebe

U koliko lekar nije propisao drugačije, treba slediti dole navedeno uputstvo za upotrebu proizvoda. Važno je pridržavati se ovih uputstava, u suprotnom, upotreba proizvoda može biti nedelotvorna.

Odrasli i deca starija od 12 godina mogu da koriste jednu kesicu praška za peroralnu primenu sa 125 mg simetikona 3 puta dnevno, za vreme ili posle obroka. Takođe, može se koristiti i uveče pre spavanja, ili po potrebi, vodeći računa da se ne prelaze preporučene doze.

Sipati sadržaj kesice direktno u usta, na jezik. Prašak se rastvara u pljuvački i potom ga treba progutati.

Treba upotrebiti čitav sadržaj kesice. Nakon upotrebe se može popiti malo vode, po želji.

Trajanje terapije zavisi od razvoja tegoba.

Ipak, preporučuje se izbegavanje kontinuirane upotrebe proizvoda duže od 30 dana.

U slučaju da se postojeći simptomi nastavljaju, obratiti se svom lekaru kako bi se utvrdio njihov uzrok.

Predoziranje i ostale greške prilikom uzimanja proizvoda

Aktivni princip sadržan u praška za peroralnu primenu razgrađuje mehuriće vazduha koji se nalaze u gastrointestinalnom traktu, isključivo fizičkim putem i inertan je sa hemijsko-biološkog aspekta. Proizvod prolazi kroz gastrointestinalni trakt nepromenjen i eliminiše se bez apsorpcije. Nisu prijavljeni slučajevi predoziranja.

Šta da radite ako ste zaboravili da uzmete jednu dozu praška za peroralnu primenu ili ako niste uzeli dovoljnu dozu?

Nastaviti sa uzimanjem prema onome što je navedeno u uputstvima za upotrebu koja se odnose na doziranje.

Šta se može desiti ako se prekine lečenje ili se završi pre predviđenog vremena?

U tom slučaju simptomi se mogu ponovo javiti.

Neželjena dejstva

Koja neželjena dejstva se mogu javiti primenom praška za peroralnu primenu?

Neželjena dejstva koja su zabeležena tokom kliničkih ispitivanja bila su retka, blagog intenziteta i pretežno u vezi sa gastrointestinalnim sistemom (bolovi u stomaku, dijareja).

Ako se ipak pojave neželjena dejstva, obavestite svog lekara o tome.

Uputstva i preporuke za čuvanje medicinskog sredstva

Datum isteka roka upotrebe proizvoda nalazi se na kesicama i na pakovanju.

Ne koristiti proizvod ako je pakovanje otvoreno ili oštećeno.

Ne koristiti posle datuma isteka roka upotrebe.

Kako se čuva prašak za peroralnu primenu?

Čuvati proizvod na hladnom i suvom mestu. Držati proizvod van domašaja dece.

Ovlašćeni predstavnik proizvođača i distributer:

Esensa d.o.o., Viline vode bb, Beograd, Republika Srbija, www.esensa.rs



Broj rešenja o registraciji medicinskog sredstva: 515-02-01103-20-004 od 15.05.2020.

Datum izdavanja uputstva za upotrebu medicinskog sredstva: mart 2020. godine